

Problemet jaktödem på jakthundar

Nedanstående information kring ämnet finns att läsa i RAS 2018-2022

Information om lungödem som uppkommit i samband med jakt - ofta kallat jaktödem:

De vanligaste symtomen är andningsproblem efter eller i samband med jakt och onormal trötthet.

Direkt efter jakten förefaller hunden oftast tröttare än förväntat av en frisk hund.

Inom någon timme efter jaktens slut brukar man kunna höra och se att hunden hostar lite och ibland sitter de hellre än de ligger och nosen håller de då gärna uppåtriktad.

Om man studerar hundens sätt att andas ser man att hunden tar många och djupa andetag per minut, uppåt 60 till 100 andetag per minut i andningsfrekvens. (Om man vill räkna andningsfrekvensen bör man göra det när hunden ligger eller sitter still - gör det gärna genom att observera hunden på lite avstånd och räkna antalet andetag under en minut).

Detta tillstånd håller i sig från ca 4 timmar upp till 2 dygn efter jakten.

Oftast tillfrisknar hundarna spontant, men tillståndet kan förvärras och i vissa fall kan hunden t.o.m. avlida inom några få dygn efter jakten. Veterinär bör konsulteras om hunden har stora andningssvårigheter.

De som sett dessa symtom på sin hund har svårt för att förringa problematiken kring det hela. Visst kan man till en del minska besvären genom medicinering med hjälp av vätskedrivande läkemedel eller betablockerare (håller ner puls) men faktum kvarstår, de hundar som drabbas av detta är i grunden inte friska och tål inte den fysiska belastning som man kan förvänta sig av en normalt arbetande drever.

SDK har från centralt håll velat angripa detta problem på olika sätt men har hittills inte lyckats nå tillfredsställande resultat i arbetet. Det finns de som menar att sjukdomen inte är något större problem utan bara lite bekymmer ute i marginalen men CS uppfattning är att jaktödem med stor sannolikhet är betydligt mera frekvent än vad vår statistik visar.

Handen på hjärtat, har du själv inte i dina samtal med dreverägare fått höra både ett eller kanske till och med flera exempel på hundägare som råkat ut för detta?


Nedan kommer du att få ta del av illustrationer på sjukdomsstatistik från ett antal hårt arbetande jaktraser hämtade ur diagram 6 från AGRAS Breed Profiles 2011 – 2016. Materialet bygger på statistik från Agria Djurförsäkring.

Samtliga exempel visar en jämförelse mellan förekomsten av en viss diagnos för aktuell ras och genomsnittsförekomsten för alla registrerade raser som besökt veterinär och diagnostiserats med de diagnoser som finns upptagna. Den jämförelsen känns kanske irrelevant för drever men jämför man resultaten med andra hårt arbetande hundraser, som diagram längre ner visar, får man ändå en mycket tydlig fingervisning.

Det första diagrammet visar förekomst av sjuklighet av olika slag för dreverrasen. Den gula linjen representerar den genomsnittliga förekomsten för alla raser för respektive sjuklighet. Diagnosgruppen *Cirkulation/Blödning/ Ödem/Infarkt i de nedre luftvägarna* är den grupp där vi sannolikt hittar de flesta antalet jaktödem. Denna diagnosgrupp har överlägset högst relativ risk inom vår ras. Diagrammet visar att det är nästan 15 gånger vanligare än genomsnittet för samtliga raser att en drever får en diagnos inom den gruppen.


Diagram 1

– Drever jämförd med Alla Raser 2011-2016




Det andra diagrammet listar samma diagnosgrupp för fler arbetande jakthundraser än drevern.

Diagram 2



Beroende på tydligheten i symtom finns det säkert hundar med problem som ibland gränsar till jaktödem men att de ändå inte tolkats som fullt utvecklade ödem och därför hamnat i en diagnos som ligger på gränsen till jaktödem. I beagle, tax och PBGV:s fall kan detta gälla detta symtom på hjärtsvikt och i Basset Fauves fall trötthet (onormal), som ofta är ett av de karakteristiska tecknen vid jaktödem.

Diagram 3



Visst finns det andra tänkbara orsaker till andningsbekymmer t.ex. lunginflammation men symtombilden för lungödem följer väldigt väl det som finns beskrivet inledningsvis i RAS ovan. För tydlighetens skull kan du här se några videosekvenser på hundar med pågående lungödem.

Film 1	Typisk kroppsställning med uppåtsträckt huvud för att underlätta andningen.
Film 2	Kompletterande bukandning för att kompensera dålig ventilation p.g.a. vätska i lungorna och hostliknande andning för att kraxa upp vätska ur andningsvägarna.
Film 3	Mkt hög andningsfrekvens med en annars till synes välmående drever men skenet bedrar. Händer detta i skogen får ofta hunden stora svårigheter att ta sig tillbaka till dess ägare p.g.a. extrem kraftlöshet.

CS vill med denna lilla information medvetandegöra/tydliggöra för alla dreverägare om det problem som vår ras har att jobba med. Eftersom våra dreverägare är mån om sin egen drevers hälsa, vilket de veterinärbesök som registrerats vittnar om, borde även omsorgen om den egna rasen ligga nära till hands. Tillsammans med er vill vi verka för att, en i övrigt i huvudsak frisk ras, befrias från lungödemets gissel. Prio ett i denna fråga, näst efter den egna hundens hälsa, borde vara att vi värnar om vår egen ras. Allt annat borde vara sekundärt i sammanhanget.

SDK har som målsättning att halvera frekvensen av lungödem inom vår ras fram till år 2022 och den absolut viktigaste pusselbiten i det jobbet är kartläggning av problematiken. Det är av största vikt för framtidens drevar att dagens fall lyfts upp till ytan.

Så har din hund haft liknande problem, enligt symtomen som beskrivs ovan, tveka inte. Skicka in en anmälan om lungödem så fort det bara går.

Anmälan skickas in till Kjell Andersson: kjellandersson600@gmail.com

([Länk till lungödemsblankett](#))

Referenser:

- RAS 2018- 2022 (Utdrag)
- AGRIA Breed Profiles 2011 – 2016 (valda delar av). Fullständiga profiler om man vill fördjupa sig kan rasklubbar få via SKK, annars finns de tillgängliga för medlemmar på Agriabreedersclub.se
- Facebook. Gruppen Jaktödem – Ödem (videofiler med tillåtelse av de som publicerat)